



纯疱疹

Herpes Simplex)

www.medisk.cn



单纯疱疹 (Herpes Simplex)

- ◆ 单纯疱疹是由人类单纯疱疹病毒感染所致的病毒性皮肤病。皮疹以群集性水疱为特征，能引起多种部位感染，通常以口周，鼻腔，生殖器等为好发部位。本病有自限性，但易复发。



单纯疱疹 (Herpes Simplex)

- ◆ 病因及发病机理
- ◆ 临床表现
- ◆ 诊断与鉴别诊断
- ◆ 防治



病因及发病机理

- ◆ 本病的病原体为单纯疱疹病毒 (HSV)，此病毒为DNA病毒，通常分为HSV-I型和HSV-II型。HSV-I型主要引起生殖器以外的皮肤、粘膜和器官的感染；HSV-II型则主要引起生殖器部位的皮肤、粘膜以及新生儿的感染。人是人类单纯疱疹病毒唯一的自然宿主。原发性感染中90%为隐性，HSV感染人体后不产生永久性免疫。



临床表现

- ◆ 原发型单纯疱疹
- ◆ 复发型单纯疱疹

www.mediskn.cn









原发型单纯疱疹

- ◆ 皮肤单纯疱疹
- ◆ 口腔单纯疱疹
- ◆ 新生儿单纯疱疹
- ◆ 疱疹性外阴阴道炎
- ◆ 接种性单纯疱疹



复发型单纯疱疹

- ◆ 常由各种诱发刺激如发热，月经，受凉，消化不良等引起，具有在同一部位多次复发的倾向，患者多为成人，通常根据发病部位而有不同的临床表现，复发型单纯疱疹往往较原发型的水疱小且密集。



生殖器疱疹 (genital herpes)

- ◆ 又称为复发性阴部疱疹，是一种性传播疾病，主要为HSV-Ⅱ型感染所致，少数由HSV-Ⅰ感染所致。皮损特点为散发水疱，易破溃形成糜烂，局部疼痛明显，局部淋巴结不肿大，很少有全身症状。生殖器疱疹易于复发。



诊断与鉴别诊断

- ◆ 常见的单纯疱疹多为复发型，根据临床特点如成群的水疱，好发于皮肤粘膜交界处，多见于发热及消化障碍的疾病中，自觉有灼热及痒感，病程短，易复发等特点即可诊断。
- ◆ 鉴别诊断的疾病为脓疱疮，水痘，带状疱疹等。



预防

- ◆ 单纯疱疹到目前为止尚无特殊的防治方法。主要是尽量避免各种诱发因素。对生殖器疱疹者要进行必要的性教育，对患有活动性生殖器疱疹的早期孕妇应及早终止妊娠，对既往有生殖器疱疹史的孕妇，应在妊娠末期做HSV-Ⅱ培养，若是阳性则采用剖腹产。



治疗

- ◆ 全身性治疗
- ◆ 局部治疗

www.mediskin.cn