



www.mediskin.cn

丹毒



又名

- ◆ 丹疹\火丹\天火,首见于《素问至真要大论》
- ◆ 因皮肤红如涂丹, 热如火灼,故以颜色命名
- ◆ 丹毒是患部皮肤突然发红成片、色如涂丹的急性感染性疾病。
- ◆ 其特点是病起突然, 恶寒发热, 局部皮肤忽然变赤, 色如丹涂脂染, 焮热肿胀, 边界清楚, 迅速扩大, 数日内可逐渐痊愈, 但容易复发。相当于西医的急性网状淋巴管及周围组织炎。



文献

- ◆ 《诸病源候论》
- ◆ “丹者，人身忽然欣赤，如丹涂之状，故谓之丹。或发于手足，或发腹上，如手掌大，皆风热恶毒所为，”
- ◆ “不急治，则痛不可堪，久乃坏烂，去脓水数升。若发于节间，使流之四肢。毒入肠则杀人，小儿得之最忌。”



此外

- ◆ 《外科正宗》
- ◆ 《疡医准绳》
- ◆ 《外科启玄》
- ◆ 《外科大成》

病因、病机、命名、辨症论治等。

命名

- ◆ 根据发病部位的不同而有不同的病名，
- ◆ 生于躯干部者，称内发丹毒；
- ◆ 发于头面部者，称抱头火丹；
- ◆ 发于小腿者，称流火；
- ◆ 新生儿多生于臀部，称赤游丹。





www.mediskin.cn





胸腹腰胯部

- ◆ 内发丹毒，《疮疡经验全书》
- ◆ “丹毒，内丹毒从胁下至腰下，肿发赤色，名曰内丹，如早觉可治，致腰便不可治。”

www.med888.cn



下肢

- ◆ 流火

- ◆ 《外科证治全书》

- ◆ “流火，生小腿，红肿放亮，热痛如烧，不溃不烂，多在小腿肚之下。时医惟知以镰血出，或以鳝鱼血涂，总无全愈之日，时常发作，复镰复涂而已。”



www.mediskin.cn





www.mediskin.cn





年龄而命名

- ◆ 新生儿
- ◆ 医宗金鉴：“赤游丹毒，小儿赤游丹之证，皆由胎毒所致。”

www.med8skin.cn



特点

- ◆ 突然发病，
- ◆ 局部皮肤变赤，色如丹涂脂染。（红斑边界清）
- ◆ 迅速扩大，发无定处。（毒邪所致）



病因病机（西医）

- ◆ β -溶链
- ◆ 网状淋巴管及其周围组织
- ◆ 表皮、真皮浅层。
- ◆ 一般不化脓、不发生组织坏死



www.mediskin.cn

中医病因病机



《圣济总录》

- ◆ “热毒之气，暴发于皮肤间，不得外泄，则蓄热为丹毒”

www.med888.cn



从皮损、病性特点

- ◆ 红斑
- ◆ 灼热
- ◆ 疼痛
- ◆ 起病急 发展迅速
- ◆ 血热火毒



为什么发病部位不同？

所化火毒之病邪性质不同

上部:天行热疫毒邪或风热之邪(“抱头火且毒者，中于天行热毒而发。” 疡科心得集)

中部:肝经火旺，脾经湿热相感而成(“内发丹毒，此证由肝脾二经，热极生风所致。” 医宗金鉴)

下部:湿热下注，化为火毒

小儿:“赤游丹毒，小儿赤游丹之证，皆由胎毒所致。” 医宗金鉴

临床所见

- ◆ 患者多有局部破损史
- ◆ 下部多与脚癣有关

www.med66.com



www.mediskin.cn

临床表现

部位

- ◆ 颜面部
- ◆ 小腿（易反复、大脚风）

www.med8skin.cn





病史

- ◆ 破损史
- ◆ 患者自己不明

www.med5skin.cn



前驱症状

- ◆ 有些患者有
- ◆ 有些没有
- ◆ 邪在肌表之表现

www.mediskin.cn



www.mediskin.cn

局部表现



主皮损

◆ 红斑

www.mediskin.cn

特点

- ◆ 略高皮面
- ◆ 初色鲜红
- ◆ 迅速扩大
- ◆ 边界清楚

www.mediskin.cn





www.mediskin.cn







颜色变化

- ◆ 鲜红
- ◆ 暗红
- ◆ 棕黄色
- ◆ 脱屑而愈

www.mediskin.cn



局部表现

- ◆ 水肿性边界清的片状红斑（鲜红色）。
- ◆ 迅速扩大
- ◆ 表面紧张光亮，灼热有触痛
- ◆ 严重时红斑可见水疱、大疱等。
- ◆ 鲜红斑-----暗红斑-----脱屑而愈



严重时

- ◆ 水疱
- ◆ 大疱
- ◆ 瘀点
- ◆ 瘀斑
- ◆ 皮肤坏死

www.mediskin.cn





由于部位不同表现略有区别

◆ 颜面部

www.mediskin.cn





颜面部

- ◆ 从一侧开始----形成蝶形红肿，扩大-----整个面部红肿-----眼睑肿胀。

www.med66.com





受邪部位不同，扩肿不同

- ◆ 耳部破损
- ◆ 先肿于耳周，再肿头角
- ◆ 头皮破损
- ◆ 先肿头额，再肿及脑后



下肢

- ◆ 流火
- ◆ 大脚风

www.mediskin.cn



重症

- ◆ 新生儿
- ◆ 年老体弱者

www.mediskin.cn



鉴别诊断

- ◆ 发

- ◆ 接触性皮炎

www.mediskin.cn





类丹毒



www.mediskin.cn



中医辨证（按部位辨证）

www.mediskin.cn



www.mediskin.cn

头面部



风热毒蕴证

- ◆ 部位
- ◆ 风热袭表：
- ◆ 疏风清热解毒
- ◆ 普济消毒饮
- ◆ 风盛者用荆防败毒散、热盛者用仙方活命饮



www.mediskin.cn

肋肋部



肝脾湿火证

- ◆ 部位
- ◆ 胸腹腰胯部
- ◆ 清肝泻火利湿
- ◆ 龙胆泻肝汤

www.mediskin.cn



下肢小腿

www.mediskin.cn



湿热毒蕴证

- ◆ 下部
- ◆ 湿热中阻:
- ◆ 清热利湿解毒
- ◆ 五神汤合萆薢渗湿汤

www.mediskin.cn



小儿

www.mediskin.cn



赤游丹

- ◆ 《外科大成》
- ◆ “丹毒受毒于未形之后，由胎养失宜所致”
- ◆ “小儿无故眼生厚眵，或眼胞红晕，微有气喘，夜则烦啼，此欲发丹之候也，急服兰根等药，潜消其毒。”



胎火蕴毒证

- ◆ 凉血清热除湿解毒
- ◆ 犀角地黄汤合黄连解毒汤

www.med66.com



外治

- ◆ 视皮损以施治

www.mediskin.cn



红斑（水肿）

- ◆ 金黄散外调擦
- ◆ 或用30~50%硫酸镁
- ◆ 或用草药外敷

www.med5k.com



水疱（大疱）时

- ◆ 空针抽水疱
- ◆ 再敷

www.mediskin.cn



砭镰法

- ◆ 复发性丹毒
- ◆ 可浅刺也或围刺

www.med8skin.cn



预防与调护

- ◆ 休息，饮食
- ◆ 抬高患肢，足穿弹力袜
- ◆ 治疗原发病

www.mediskin.cn

- 
- ◆ 王某，男，62岁。2002年7月22日初诊。患者2天前出现恶寒发热，体温39℃左右，后右小腿肿痛，头痛骨楚，纳呆，便秘溲赤。有足癣史。
 - ◆ 体检：T：38.2℃，右小腿大片焮红，边界清楚，压之褪色，扪之灼手，触痛明显，右腹股沟触及一枚肿大淋巴结，触痛（+）。右足趾间皮肤糜烂、脱屑。舌质红，舌苔黄腻，脉滑数。血常规检查：WBC： $15.1 \times 10^9/L$ ，N：85%。

◆ 辨证论治：

◆ 第一步：明确诊断。根据患者有脚湿气病史；局部红赤灼热，如涂丹之状，肿胀疼痛，红斑边缘与正常皮肤有明显分界；病变附近有髂核肿痛；开始即有恶寒，发热，头痛，周身不适等症状；血常规检查白细胞总数及中性粒细胞比例明显增高，可以初步诊断为小腿丹毒，并应与发相鉴别。

◆ 第二步：进行必要的检查，为掌握感染的程度，应查血常规，同时为明确患者是否有糖尿病，应查血糖。

◆ 第三步：进行辨证论治。湿热毒邪瘀结于下肢，郁阻肌肤，经络阻塞，故局部红赤肿胀、灼热疼痛。舌质红，舌苔黄腻，脉滑数，为湿热蕴结之象。证属湿热毒蕴，治拟清热利湿解毒，方用五神汤合萆薢渗湿汤加减。

◆ 处方：生地 18g 丹皮 12g 赤芍 9g 忍冬藤 18g 连翘 9g 紫花地丁 30g 川牛膝 12g 赤苓 12g 车前子 18g（包）萆薢 12g 黄柏 9g 虎杖 15g

◆ 第四步：根据患者的兼证对上述方剂进行加减。肿胀甚，加赤小豆、丝瓜络、鸡血藤以利湿通络；纳呆，加陈皮；便秘，加生大黄、枳实以泻下通便。

◆ 第五步：辨证选择外治法。金黄膏外敷。

◆ 第六步：调摄与生活指导。流火患者抬高患肢 30 0~40 0；应彻底治愈脚湿气，以减少复发；本病常在多走、多站及劳累后复发，应尽量避免。