



第九节 丹毒

丹毒是皮肤突然发红、色如涂丹的一种急性感染性疾病。

西医也称丹毒，又称急性网状淋巴管炎。

临床特点



其临床特点是病起突然，恶寒壮热，局部皮肤忽然变赤，色如丹涂脂染，焮热肿胀，迅速扩大，边界清楚，发无定处，数日内可逐渐痊愈。每多复发。



本病发无定处。好发于颜面、腿足。根据其发病部位的不同名称各异，如生于胸腹腰胯部者，《外科大成》称内发丹毒；发于头面部者，《疡科心得集》称抱头火丹（图）；发于小腿足部者。

《外科大成》名腿游风，《疡医大全》称流火（图）；新生儿多生于臀部，《医宗金鉴·外科心法要诀》称赤游丹毒。



病因病机

总由血热火毒为患。

素体血分有热，外受火毒，热毒蕴结，郁阻肌肤

血分热毒

破损染毒

肌肤破损，毒邪乘隙侵入

丹毒的发生



病因病机

- 西医认为本病是由溶血性链球菌经由皮肤或黏膜细小创口，引起的皮肤及其网状淋巴管的急性炎症。



诊断

- 1. 临床表现多发于小腿及面部。新生儿丹毒，常为游走性。发病前可有皮肤或黏膜破损、足癣等病史。
- 具体临床表现。
- 2. 实验室及其他辅助检查血常规检查提示血白细胞总数及中性粒细胞比例明显增高，浆液性渗出液中细菌培养可发现 β -链球菌生长。

鉴别诊断

发 局部虽红，但中间隆起而色深，四周较淡，边界不清，胀痛呈持续性，化脓时跳痛，大多可坏死、溃烂；全身症状没有丹毒严重；不会反复发作。


接触性皮炎 有过敏物接触史；皮损以红肿、水泡、丘疹为主，伴焮热、瘙痒，但无疼痛；一般无明显的全身症状。

类丹毒 多发于手部，与职业有关，来势慢，范围小，症状轻，无明显全身症状。

瓜藤缠 好发于青年女性，常绕胫而发，分布于小腿伸侧，皮肤色红漫肿，疼痛或压痛，常反复发作，但皮下叩及结节。

治疗

以凉血清热、解毒化瘀为原则。发于头面者，需兼散风清火；发于胸腹腰胯者，需兼清肝泻脾；发于下肢者，需兼利湿清热。





预防与调护

- (1) 卧床休息，充分饮水，抬高患肢。
- (2) 有肌肤破损者，应及时治疗，以免感染毒邪；因脚湿气致下肢复发性丹毒患者，应彻底治愈脚湿气，以减少复发。
- (3) 已形成大腿风者，每可用绷带缠缚，宽紧适度；亦可用医用弹力护套绷缚。
- (4) 戒除挖耳、挖鼻恶习。

www.meddiskin.cn

本节完

- 发病急骤，全身症状明显。

初起常有突然发冷、恶寒、高热、头痛骨楚、胃纳不香、便秘溲赤等。

继则局部皮肤见片状红疹，迅速蔓延成大片鲜红斑，略高出皮肤，边界清楚，压之皮肤红色消退，去除压力后重复出现红色，若热重出现紫斑时，则压之不褪色。患部表面紧张光亮，摸之灼手，肿胀、触痛明显。

- 发生在头面部者，如由于**鼻部破损引起者**，先发于鼻额，次肿于目，而使两眼睑肿胀不能开视；如由于**耳部破损引起者**，先肿于耳之上下前后，次肿及头角；如由于**头皮破损引起者**，先肿于头额，次肿及脑后；
- **发于腿胫部者**，多由趾间皮肤破损引起，先肿于小腿，亦可延及大腿，愈合容易复发，常因反复发作，皮肤粗糙增厚，下肢肿胀而形成淋巴性水肿（象皮腿）；
- **新生儿丹毒**，常游走不定，多有皮肤坏死，全身症状严重。

- 本病皮损由四肢或头面走向胸腹者，为逆证；
- 新生儿及年老体弱的患者，治疗不当或调护不慎易致毒邪内陷，而致危证；
- 发于下肢者，常因原发病灶的存在，愈后易反复发作，久可形成大脚风。

风热毒蕴证

- 证候：发于头面部，皮肤焮红灼热，肿胀疼痛，甚则发生水泡，眼胞肿胀难睁；伴恶寒发热，头痛；舌质红，苔薄黄，脉浮数。
- 治法：疏风清热解毒。
- 方药：普济消毒饮加减。大便干结者加生大黄、芒硝以泻下通腑；咽痛加生地、玄参。

肝脾湿火证

- 证候：发于胸腹腰胯部，皮肤红肿蔓延，按之灼手，肿胀疼痛；伴口干口苦；舌质红，苔黄腻，脉弦滑数。
- 治法：清肝泻火力湿。
- 方药：龙胆泻肝汤或化斑解毒汤加减。

湿热毒蕴证

- 证候：发于下肢，局部红赤肿胀、灼热疼痛，或见水泡、紫斑，甚至结毒化脓或皮肤坏死；伴轻度发热，胃纳不香；舌质红，苔黄腻，脉滑数。反复发作，可形成大脚风。
- 治法：利湿清热解毒。
- 方药：五神汤合萆薢渗湿汤加减。肿胀甚，或形成大脚风者加赤小豆、丝瓜络、鸡血藤以利湿通络。

胎火蕴毒证

- 证候：发生于新生儿，多见臀部。局部红肿灼热，常呈游走性；或伴壮热烦躁，甚则神昏谵语、恶心呕吐；舌质红绛，苔薄，脉数。
- 治法：凉血清热解毒。
- 方药：犀角地黄汤合黄连解毒汤加减。壮热烦躁，甚则神昏谵语者加服安宫牛黄丸或紫雪丹以清心开窍；阴虚，舌质绛，舌苔光者加玄参、麦冬、石斛等。

外治

- ①**外敷用玉露散或金黄散**，以冷开水或鲜丝瓜叶捣汁或金银花露调敷，并时时湿润；或鲜荷花叶、鲜蒲公英、鲜地丁全草、鲜马齿苋、鲜冬青树叶、绿豆芽菜等捣烂湿敷。
- ②若**流火结毒成脓者**，可在坏死部分作小切口引流，外掺九一丹、敷金黄膏。
- ③**砭镰法**：患处消毒后，用七星针或三棱针叩刺患处皮肤，放血泄毒，或配合拔火罐，令出恶血，任其自流，待自止后，敷金黄散。此法只适宜于下肢复发性丹毒，禁用于抱头火丹、赤游丹患者。



抱头火丹

抱头火丹
1/1





流火

1/4



流火

2/4



流火

3/4

37c.com.cn

www.mediskin.cn

流火

4/4

