

花斑癣

- ❖ 致病菌：圆形或卵圆形糠秕孢子菌
- ❖ 嗜脂性 条件致病菌
- ❖ 由酵母型转化为菌丝型（致病状态）



www.mediskin.cn






www.mediskin.cn




圆形糠秕孢子菌菌落



花斑癣鳞屑镜检
见糠秕孢子菌

糠秕孢子菌荧光



促发因素

- ❖ 外因
 - 温度和湿度
 - 脂类物质涂擦身体
 - 衣服封闭及二氧化碳张力高
- ❖ 内因
 - 遗传性
 - 免疫功能
 - 多汗

www.mediskin.cn

糠秕孢子菌引起的其他疾病

❖ 浅部感染:

毛囊炎；脂溢性皮炎；异位性皮炎

❖ 深部感染:

败血症，与脂类物质静脉输注有关；

呼吸道感染；腹膜炎；乳腺炎；

化脓性关节炎；鼻窦炎；泪腺炎等



www.mediskin.cn



治 疗

- ❖ 内外结合疗效好
- ❖ 外用：采乐洗浴等
- ❖ 内服：

特比萘芬： 250毫克/日；连服7天

伊曲康唑： 200毫克/日；连服7天

氟康唑： 150毫克/周；连服4周

谢 谢

www.mediskin.cn

