

疣

verruca

病毒性皮肤病

# 一、定义

- 疣由人类乳头瘤病毒（**human papilloma virus, HPV**）选择性感染皮肤或粘膜上皮所引起的表皮良性赘生物。

## 二、 传染途径

- 多系直接接触传染。
- 疣的发生与消退与免疫功能有关，尤以细胞免疫为主。

## 三、临床表现

- 4型：
  - 1.寻常疣 ( **verruca vulgaris** )
  - 2.跖疣 ( **verruca Plantaris** )
  - 3.扁平疣 ( **verruca plana** )
  - 4.尖锐湿疣 ( **condyloma acuminatum** )
- 病毒存在于表皮棘c中，使其增生，形成疣状。

# 1. 寻常疣 (Verruca Vulgaris)

- 俗称刺瘊
- 皮疹：丘疹（豌豆大，质硬，污褐色，表面粗糙）
- 自觉：无，易出血
- 好发部位：手背、手指、足缘等






# 1. 寻常疣 (Verruca Vulgaris)

其他部位可见：

- 甲周疣
- 甲下疣
- 丝状疣（好发于颈、眼睑）
- 指状疣（好发于头皮及趾间）

## 2. 跖疣 (Verruca Plantaris)

14:50



- 发生在足跖的寻常疣
- 皮疹：小丘疹→斑块或扁平丘疹（淡黄或褐黄，表面粗糙，中央微凹，用刀刮去角质，有点状出血，形成小黑点
- 自觉：压痛



# 3. 扁平疣 (Verruca Planae)



- 好发年龄：青少年
- 好发部位：面、手背、颈、胸部和前臂及腿屈侧
- 皮疹：扁平丘疹（针头大至米粒大，圆形，浅褐或肤色，数目不定，密集或散在分布。搔抓可成串珠状（Koebner现象）
- 自觉：微痒
- 病程：慢性，可自愈，可复发，愈后不留疤痕

37c.com.cn



# 4. 尖锐湿疣 (Ccondyloma acuminata)



- 属性传播性疾病
- 好发部位：外生殖器、肛门
- 皮疹：淡红色赘生物，柔软，乳头状、蕈状、菜花状
- 自觉：瘙痒或疼痛



## 四、治疗

- 1. 局部治疗
- 2. 全身治疗

# 1. 局部治疗

1. 数目少者，电灼、冷冻、激光、刮除

2. 数目多者：3% 酞丁胺霜

0.05%~0.1% 维A酸软膏

氟尿嘧啶软膏可色素沉着，慎用

平阳霉素10mg用普鲁卡因20ml稀释注

射疣根部

## 2. 全身治疗

- 1) 聚肌胞注射液2~4ml, im, 2/w
- 2) 干扰素 $1 \times 10^6$ IU, 皮下注射, qd  $\times 10 \sim 14$ ,  
改为3/w
- 3) 左旋咪唑, 50mg/d, tid, 连服3d, 停11d,  
再服3d为一疗程
- 4) 中药: 散风平肝、清热解毒、散结

# A型题

8. 关于扁平疣，下列说法错误的是
- A. 好发于青少年
  - B. 多发于面部、手背
  - C. 可出现Koebner现象
  - D. 可自愈
  - E. 皮疹表面呈乳头疣状突起

E

# X型题

**16. 扁平疣 的临床表现，下列说法正确的是**

- A.好发于壮年**
- B.皮损为扁平丘疹**
- C.可呈散在或线状分布**
- D.可自愈**
- E.可出现 Koebner现象**

A、B、C、D、E

# X型题

- 疣的主要治疗包括
- A.不必治疗
  - B.外用制剂
  - C.液氮冷冻
  - D.大量抗病毒药物
  - E.长期的免疫调节药物

A、B、C

