

疥疮的症状用什么药

疥疮的症状初期只有瘙痒的感觉，但不太明显！部分患者会在皮肤薄嫩的部位出现粉红色的小疙瘩！疙瘩呈水泡状，挤破后有透明液体流出，该症状夜间瘙痒明显。夜间会阵发性的剧烈瘙痒。皮肤薄嫩处（如大腿内侧、腋窝下、手指缝、乳房、小腹部、会阴部、生殖器部位等）常出现皮疹，为粟米大小的丘疹或丘疱疹。症状部位可见疥虫掘的隧道，呈灰褐色不规则曲线。

疥疮的介绍

吉祥

- 疥疮是疥螨寄生于人体表皮引起的疾病.其特点是受染皮肤出现丘疹.水疱及隧道,有剧烈瘙痒,因搔抓易发生继发性感染,接触传染性强.疥疮在世界范围内也广为流行,且常呈周期性.疥疮通过人与人之间的直接或间接接触而传染,易在家庭及集体中传播.疥螨也可侵染羊.狗.猪.兔.牛.马等动物,通过与这些动物接触,也可受染疥疮.

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

疥疮的症状分类

吉祥堂

- 当感染疥疮之后，首先出现的症状是皮肤刺痒，在瘙痒部位同时出现小皮疹，小水疱或结痂等皮疹。其痒甚剧，一般白天稍轻，夜晚加重，往往由于搔抓，遍体搔痕，甚至血迹斑斑，病人难以入睡 疥虫穿入表皮之后，一般需经20-30日的潜伏期才出现皮疹及瘙痒症状。

■ 疥疮严重期症状：[疥疮](#)如果治疗不及时，没有及时使用疥舒对于疥虫进行灭杀，在皮肤薄嫩地方出现黄豆大或绿豆大的硬疙瘩（[疥疮结节](#)），通常发生在阴囊、阴茎、阴唇、腹股沟等处发生黄豆大小的淡红色结节。这种结节往往经久不消，常伴有剧烈瘙痒。

疥疮分类



- 1. 成人疥疮：主要症状是瘙痒、红色小丘疹、丘疱疹小水疱、隧道、结节和结痂。
- 2. 老年人疥疮：瘙痒严重，对疥虫反应较弱，所以无明显炎症反应。背部多见。
- 3. 婴幼儿疥疮：很难找到隧道和疥螨，应疹形态不典型，好发于头面部，隧道色淡而浅在，隐约如线状，基底轻度炎症而粉红色，易伴发水病，且易透过角质层窥见虫点，呈白色小点状突起。
- 4. 结节性疥疮：多见于阴囊、臀、腹及股部。呈红棕色结节，奇痒，数月以上才逐渐消退。
- 5. 挪威疥：（Norwegianscabies）又称痂皮性疥疮，本型系1844年Dabielsen、1848年首先在挪威报告的一种疥疮的异型，故称挪威疥疮。是一种免疫异常反应。多发于体弱患者。表现为皮肤干燥、结痂，出现角化过度的红斑鳞屑性斑块，还可出现糜烂、脓疱、恶臭，毛发干枯脱落、指甲变厚变扭曲、全身淋巴结肿大，鳞屑厚，病情重，传染性极强。
- 6. 局限性疥疮。

疥疮的检测



- 疥疮应根据患者接触传染史，皮损部位，奇痒，隧道和丘疱疹为主。常一家人同患病，不难诊断，若能找出疥螨，则诊断尤为确实。

- 疥螨的检查方法：

- (一) 寻找隧道的方法

- 用蓝墨水滴在可疑隧道皮损上，再用棉签揉擦30秒钟至1分钟，然后用酒精棉球清除表面黑迹，可见染成淡蓝色的隧道痕迹。

- (二) 针挑法

- 在指侧，掌腕皱纹及水疱、脓疱等处找到疥虫隧道。并仔细找到隧道的末端发现白色虫点，此处最易查出疥虫的皮疹。方法：选用6号注射针头，持针与皮肤平面成 10° ~ 20° 角，针口斜面向上。在隧道末端虫点处，距离虫点约1mm垂直于隧道长轴进针，直插至虫点底部并绕过虫体，然后放平针干（成 5° - 10° ）稍加转动，疥虫即落入针口孔槽内，缓慢挑破皮肤出针（或直接退出）。移至有水（或10%KOH，NS）的玻璃片上，然后在显微镜下查疥虫。

疥疮治疗用药注意



- 1. 治疗前须先用温水肥皂洗澡。
- 2. 用药范围除头面部以外部位均须涂抹疥舒，尤其是皮肤皱褶部位如指缝等，需多次用力涂抹疥舒。
- 3. 若用硫磺霜应早晚各1次，连用3天，第四天洗澡更衣，为一个疗程。若用1% γ -666制剂则在用药后24小时洗澡更衣为一个疗程，第二疗程需在下周进行。两种疗法最好都用两个疗程为宜，因为疥虫卵发育为成虫需10天左右。
- 4. 前8天要全身使用，不管有没有症状的部位必须用到，每次用“疥舒”10g，脖子以下全身涂抹，早晚各一次，结节部位每日涂抹4-5次。8天以后局部涂抹结节部位，每日4-5次，8-12天就可以完全消退。
- 4. 同居一室者需一起治疗，以避免反复交叉感染。
- 5. 疗程结束后，衣物及被具需煮沸消毒，不能煮的可水烫或日晒。
- 6. 男性阴囊瘙痒性结节的治疗往往需要1~2个月。



疥疮的预防方法

吉祥意

1. 注意个人卫生，对被污染的衣服、被褥、床单等要用开水烫洗灭虫，如不能烫洗者，一定要放置于阳光下曝晒1周以上再用。

2. 出差住店要勤洗澡，注意换床单。

3. 不要与他人共用毛巾等个人卫生用品。

平常对疥疮尤其对可能被污染的衣服、被褥、生活用品要的预防首先要及时清洁，彻底消毒；其次，要避免过度的搔抓，要及时剪指甲，以防通过搔抓感染脓疥；擦药、洗澡及换衣服都要及时。

4.发现疥疮的症状，及时使用疥舒进行治疗。

疥疮与其他病的对比



- 一、皮肤瘙痒病：本病皮损无原发疹，且发无定处，指间更罕见，发病常与情绪、季节、气候变化，内脏疾患以及更年期障碍有关。
- 二、丘疹性荨麻疹：此病多见于儿童，无特殊好发部位，皮疹呈梭形风团丘疹或风团水疱为其特征。患儿常是过敏体质，有时可伴胃肠功能紊乱。
- 三、虱病：该病是虱子所引起的皮肤病，损害常见为继发疹，好发于两胁、腰带部、阴部或衣缝皱折相接触的皮肤处，且容易查到虱子及其虫卵。

疥疮用药方法



- 治疗疥疮最为重视的要是衣物和用品的消毒，如果没有做好消毒预防的措施，那么就是治好后，都很可能出现复发的症状，复发的疥疮就没有一般的疥疮好治疗，所以最好一次性治疗彻底。



参考自：<http://www.jiec120.com>

