

深部脓皮症

DP

特征:

- 浅表性或毛囊的细菌感染。破坏了毛囊形成疖病和蜂窝组织炎。继慢性浅表性脓皮症之后发生的。
- 局部性、多灶性或广泛性皮肤病变，以丘疹、脓疱、蜂窝组织炎、组织脱色、脱毛、出血性大疱、糜烂、溃疡、痂皮以及形成浆液性、甚至化脓性瘰道为特征。最常发生的是躯干和受到压迫的部位。常见淋巴结肿大。若发生败血症，也有局部发热，厌食和精神沉郁等症状



图2-41 深部脓皮病。幼犬背部分界明显的大面积蜂窝织炎和痂皮。(自 D.Angarano)



图 2-42 深部脓皮病。图 2-41 中犬的近观。表面有痂皮的破



部分资料来自互联网，仅供科研和教学使用。如有异议，请及时和我们联系。www.medicool.cn

图 2-44 深部脓皮病。伴有表面糜烂的蜂窝织炎。



图2-43 深部脓皮病。深部破溃病灶表面的痂皮。这种深部脓皮病是医源性库兴氏综合征造成的皮肤内钙质沉着引起的。

类症鉴别

- 蠕形螨、真菌感染、放线菌、诺卡氏菌病、分支杆菌、肿瘤、自身免疫性疾病。
- **诊断：**
- 细胞学（渗出物）-----球菌、杆菌
- 细菌培养主要是葡萄球菌。也可能是G⁺ G⁻



图2-45 深部脓皮病。这些表面附有痂皮的破溃病灶与继发于

部分资料来自互联网，仅供科研和教学使用，如有异议，请及时和我们联系。www.medicool.cn

采信考引起的空奴细菌感染为主



图2-46 深部脓皮病。与慢性变态反应有关的慢性细菌性感染引起的组织肿胀、溃烂和破溃

治疗：

- 1. 除去病因。
- 2. 全身用抗生素（至少8---12W）,并于临床症状消除后继续用药2W。
- 阿莫西林克拉维酸 22mg/kg q 8---12 h PO
- 克林霉素5.5----11.0mg/kg q 12 h
- 环丙沙星5----15mg/kg q 12 h
- 马波沙星2.75----5.50 mg/kg q 12 h