


人工皮炎

也为“人为皮炎”

目录



(一) 疾病描述



(二) 临床特点



(三) 病因



(四) 治疗、预防与处理



一、疾病描述

人工皮炎是患者利用物理性或化学性因素，企图达到其个人的某些欲望，强行将自身皮肤造成损伤。



临床特点

- 1、患者多为年轻女性。
- 2、一般都具有癔症性格的特征，病人多以指甲、刀、剪、钉子等利器损伤皮肤，或以高浓度石炭酸及氢氧化钾等化学品灼烧皮肤。其人为损害的皮疹形态常常是稀奇古怪的，局部可发生红斑、水疱、表皮剥脱、坏死和溃疡等各种损害，也可出现刺伤和割伤后所形成的创面。如因液体化学品灼伤，则可出现化学品在皮肤上流滴时造成的条状或点滴状的损害，手、面、颈、胸等处常易受损伤。
- 3、随皮肤损害的轻重而有不同程度的烧灼及疼痛感。




病因

本病多见于患有癔病的青年女性或神经质者。造成皮肤损害的动机不一，或为借此避开厌烦的工作环境，或为了引起他人的注意，以博取同情和怜悯，或由于某种纠纷原因，故意伤害自己而以此诬陷他人，也有部分病例原因可寻。造成皮肤伤害的刺激物种类很多常见的有尖锐或炽热的金属制品、指甲的抓挖，各种腐蚀性药液如强酸强碱的刺激，或点燃烟头烧伤皮肤等。但这里所说的各种物品所造成的皮肤损害，必须是患者本人在清醒状态下所致的，不包括他人所致的伤害，也不包括由于外用药物或化妆品所引起的接触性皮炎。

治疗

- 1.心理治疗：关心体贴病人，正确疏导教育，取得患者对医生的信任，纠正其不良的心理和精神状态，这对治疗已出现的皮损和防止继续造成新的皮肤伤害都是十分关键的。
- 2.酌情给予调节神经及镇静药物：如维生素B110mg，每日3次，口服；谷维素10mg，每日3次，口服；安定2.5mg，每日3次，口服；多虑平25mg，每日3次，口服等。
- 3.对已出现的皮肤损害，按皮肤病的治疗原则，进行对症处理。





预防与处理

对于人工性皮炎的治疗除皮肤损伤的对症处理外，还必须进行耐心的说服、教育和心理疏导，以纠正患者的心理及精神异常状态。家庭成员还要给予患者足够的宽容，避免患者情绪上出现波动。如发现患者还有发作的可能，应使其远离尖锐的器具和开水、刺激性的化学物品等。平时家属还应勤为患者剪指甲。如有潜在的精神性疾病应请精神科医生及时会诊，以便给予及时治疗，防止病情的演变和并发症的发生。

谢谢！